


## کاتتر یا شالدون چیست؟

لوله ورید مرکزی یا کاتتر، لوله باریک و نرمی است که از طریق گردن یا شانه داخل سیاهرگ مرکزی گردن شما قرار می‌گیرد و ممکن است موقت یا دائمی باشد. نوع دائم حد اکثر تا یکسال استفاده می‌شود و نوع موقت حد اکثر تا یکماه قابل استفاده است برای انجام همودیالیز ما به دو رگ نیاز داریم این لوله دو شاخه دارد از یک شاخه خون از بدن شما خارج می‌شود و داخل دستگاه دیالیز تصفیه می‌شود و از شاخه دیگر، خون تصفیه شده وارد بدن شما می‌شود.

## نحوه گذاشتن لوله ورید مرکزی:

در صورت امکان شب قبل از عمل لوله گذاری حمام نمایید عمل کاتتر گذاری در اتاق عمل به صورت سرپایی و بدون بیهوشی با بی حسی موضعی انجام می‌شود بعد از بی حسی، از طریق یک برش کوچک یک سر کاتتر تا نزدیکی قلب هدایت می‌شود و سر دیگر آن چند سانتیمتر خارج از پوست بخیه می‌شود این سر که دو شاخه است همیشه باید توسط پیچ‌های استریل بسته باشد و فقط پرستار دیالیز به وسیله آن شما را به دستگاه دیالیز وصل می‌کند.



## مراقبت‌های پس از نصب کاتتر:

یکی از عوارض مهم و شایع کاتتر عفونت است برای پیشگیری از عفونت نکات زیر را رعایت کنید:

- دست‌های خود را مخصوصا پس از توالیت با آب و صابون بشوید.
- از خاراندن پوست اطراف کاتتر و دست زدن به آن پرهیز کنید.
- پانسمان کاتتر را خیس نکنید.
- بعد از حمام کردن پانسمان را تعویض کنید.
- پانسمان را در منزل و به صورت غیر استریل تعویض نکنید.
- هیچ نوع پمادی را بدون اجازه پزشک روی کاتتر ننمایید.
- مواظب باشید کاتتر کشیده یا تا نشود.
- هرگز پیچ‌های دو شاخه را دستکاری نکنید و اگر باز شد سریع ببندید.
- هرگز بست‌های آبی و قرمز را دستکاری نکنید و اگر باز شد فوراً ببندید.
- مصرف هر گونه داروی تزریقی یا خونگیری از طریق کاتتر ممنوع است.
- اگر به هر دلیل لوله ورید مرکزی از گردن شما خارج گردید سعی نکنید آن را سر جایش برگردانید و محل آن را با یک گاز استریل ۲۱ دقیقه فشار دهید.
- شما و پرستارتان هر دو ملزم به استفاده از ماسک هستید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و  
درمانی آذربایجان غربی



کاتتر یا شالدون



واحد آموزش سلامت

تلفن: ۰۴۴-۴۴۲۲۲۲۴۳

۱۴۰۳



منبع: میبانی همودیالیز، بهروز برومند، 2017

در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر به مرکز درمانی  
خود مراجعه کنید:

- (۱) تب و لرز
- (۲) قرمزی، التهاب یا ترشح چرکی از محل ورود لوله ورید مرکزی به پوست.
- (۳) تورم دست یا بازو
- (۴) عدم کارایی در حین دیالیز
- (۵) اگر بخیه‌های لوله باز شوند یا لوله از محل خود بیرون آید بدون آنکه برای بازگرداندن لوله به جای خود تلاش کنید، فوراً یک گاز استریل روی آن بگذارید، روی آن چسب محکمی بزنید و به مرکز درمانی مراجعه کنید.